

Российская Федерация

Департамент здравоохранения и социальной
защиты

населения Белгородской области

Областное государственное бюджетное

учреждение здравоохранения

«Детская областная

клиническая больница»

308036, Белгородская область,

г. Белгород, ул. Губкина, 44

тел. (4722)55-43-64, факс (4722)55-14-34

www.belodb.ru e-mail: dob@belodb.ru

№ _____

На _____ от _____

**Отзыв лечебного учреждения об использовании препарата «Севофлуран Медисорб»,
жидкость для ингаляций, (АО «Медисорб», Россия)**

Название лечебного учреждения ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»

- Количество коек хирургического профиля 218
- Количество операций в год/месяц с использованием ингаляционной анестезии: в год 7836/
в месяц 700-800
- Какие аппараты используются для проведения ингаляционной анестезии Drager Fabius
Tiro, Stephan Portec
- Время начала использования «Севофлурана Медисорб» 15.10.2019 г.
- Количество операций, выполненных с использованием ингаляционного анестетика
«Севофлуран Медисорб» 745

Оценка эффективности использования препарата.

Введение в анестезию: *Ингаляционное применение препарата для вводного наркоза вызывает быстрое введение в анестезию и быстрый выход из анестезии. Поддержание анестезии: анестезия легко управляемая, глубина анестезии может быстро меняться в зависимости от концентрации анестетика во вдыхаемой смеси.*

Оценка безопасности препарата:

- оказывает минимальное действие на внутричерепное давление;
- не снижает реакцию на CO₂;
- не оказывает клинически значимого действия на функцию печени или почек;
- не вызывает нарастания почечной или печеночной недостаточности;
- не влияет на концентрационную функцию почек даже при длительном наркозе
- наркоз сопровождается минимальным возбуждением и признаками раздражения верхних отделов дыхательных путей;
- не вызывает избыточную секрецию в трахеобронхиальном дереве и стимуляцию ЦНС.

Количество зарегистрированных нежелательных реакций нет

из них:

серьезных: _____

непредвиденных: _____

Препарат для ингаляционного наркоза «Севофлуран Медисорб» показал хорошую эффективность. Профиль безопасности препарата сопоставим с профилем безопасности других ингаляционных анестетиков и может быть рекомендован для дальнейшего использования.

Зав. отделением анестезиологии-реанимации _____ / Мощенков С.Ю. /

должность

подпись

/ФИО/