

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## Инструкция

по медицинскому применению препарата

## Мукалтин

**Регистрационный номер: P N003415/01**

**Торговое название препарата:** Мукалтин

**МНН или группировочное название:** Алтея лекарственного травы экстракт

**Лекарственная форма:** таблетки

**Состав (на 1 таблетку)**

Алтея лекарственного травы экстракта (мукалтина) - 0,05 г

**Вспомогательных веществ:** натрия гидрокарбоната 0,087 г; кислоты винной 0,16 г; кальция стеарата 0,003 г.

### Описание

Таблетки от светло-серого до коричневатого-серого цвета, с вкраплениями более светлого и темного цвета, со специфическим запахом.

### Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** R05CA

### Фармакологические свойства

#### *Фармакодинамика*

Мукалтин представляет собой смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного, обладает отхаркивающими свойствами. Благодаря рефлекторной стимуляции, усиливает активность мерцательного эпителия и перистальтику дыхательных бронхиол в сочетании с усилением секреции бронхиальных желез.

*Фармакокинетика* – данные отсутствуют.

### Показания к применению

Острые и хронические заболевания нижних дыхательных путей, сопровождающиеся образованием трудноотделяемой мокроты повышенной вязкости (в том числе трахеобронхит, обструктивный бронхит, пневмония, бронхоэктазы) - в составе комплексной терапии.

### Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- детский возраст (до 12 лет).

### Применение при беременности и лактации

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача.

### Способ применения и дозы

Внутрь перед едой.

Взрослым и детям с 12 лет по 1 – 2 таблетки 2 – 3 раза в день.

Детям можно растворить таблетку в 1/3 стакана теплой воды.

Курс лечения в среднем 7 – 14 дней.

## **Побочное действие**

Аллергические реакции.

**Со стороны желудочно-кишечного тракта:** редко – диспепсические явления.

## **Передозировка**

До настоящего времени о случаях передозировки при применении препарата не сообщалось.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Мукалтин можно назначать одновременно с другими *препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний.*

Мукалтин не следует применять одновременно с препаратами, содержащими *кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства*, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

## **Особые указания**

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

## **Форма выпуска**

Таблетки 50 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной или бумаги с полимерным покрытием.

По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку из бумаги с полимерным покрытием.

По 1, 2, 3, 5 или 10 контурных ячейковых или безъячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается помещать контурные ячейковые или безъячейковые упаковки вместе с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку.

## **Условия хранения**

В сухом месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности**

2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

## **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

Производитель:  
Акционерное общество «Медисорб»  
Юридический адрес: 614113, Россия,  
г. Пермь, ул. Гальперина, 6  
Адрес места осуществления производства:  
614113, г. Пермь, ул. Причальная, д. 16  
Организация, принимающая претензии от  
потребителей: АО «Медисорб» 614113,  
Россия г. Пермь, ул. Гальперина, 6  
Тел/факс (342) 259-41-41  
E-mail: info@medisorb.ru  
www.medisorb.ru

